

1895

Ueber die
Resorption des Jodkalium
im normalen menschlichen Magen
unter verschiedenen Einflüssen.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

der hohen medizinischen Fakultät

der

kgl. bayer. Friedrich-Alexanders-Universität zu Erlangen

im März 1894

vorgelegt

von

Adolph Boehm

aus Landshut (Niederbayern).

ERLANGEN.

K. b. Hof- und Univ.-Buchdruckerei von Fr. Junge (Junge & Sohn).

1895.

Ueber die
Resorption des Jodkalium
im normalen menschlichen Magen
unter verschiedenen Einflüssen.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

der hohen medizinischen Fakultät

der

kgf. bayer. Friedrich-Alexanders-Universität zu Erlangen

im März 1894

vorgelegt

von

Adolph Boehm

aus Landshut (Niederbayern).



ERLANGEN.

K. b. Hof- und Univ.-Buchdruckerei von Fr. Junge (Junge & Sohn).

1895.

Gedruckt mit Genehmigung der medizinischen Fakultät zu
Erlangen.

Referent: Herr Prof. Dr. Rosenthal.

Promotions - Prüfung am 6. März 1894.

Dem Andenken seines Vaters

gewidmet

vom Verfasser.

Ehe ich zu meinen Versuchen, die ich auf gütige Veranlassung des Herrn Professor Dr. R. Fleischer anstellte, übergehe, sei mir gestattet, Allgemeines über das Mittel, mit welchem ich arbeitete, zu berichten.

Nachdem im Jahre 1812 das Jod in der Asche von Meerpflanzen entdeckt war, lag es nahe, die Wirkung der bis dorthin gebrauchten Präparate (*Aethiops vegetabilis* und *Spongia usta* gegen struma) in diesem Elemente zu suchen und dasselbe an ihre Stelle zu setzen. Zunächst wurde das freie Jod in Form der Jodtinktur verwendet, erst später das Jodkalium. Das Jodkalium, *Kalium jodatum*, *Jodidum potassii* (l'Jod de potassiome), *Kali hydrojodicum* seu *hydrojocinicum*, *Kaliumjodid*, Jodwasserstoffsauerer Kali, hydrojodsauerer Kali ist ein weisses, würfeliges, wasserfreies und luftbeständiges Salz von scharf salzigem Geschmack.

Aus der Litteratur, die ich bis Mitte der zwanziger Jahre zurück verfolgt habe, konnte ich nicht entnehmen, um welche Zeit herum Jodkalium in den Arzneischatz aufgenommen wurde; es soll dieses Mittel zuerst von Coindet in Frankreich und von Formey in Deutschland gegen Kropf empfohlen worden sein. Es muss dies aber um die Dreissiger Jahre herum gewesen sein, denn in Band XIV der Schmidt'schen Jahrbücher Seite 282, welcher im Jahre 1836 seine Herausgabe fand, schreibt ein Doktor Ebers in Breslau: „Unter den neuerlich gegen secundäre Syphilis gerühmten Mitteln hat dem Verf. das Jodkalium, *Kalium hydriodicum*, so auffallende

Dienste geleistet, dass er es für Pflicht hält, seine Erfahrungen darüber bekannt zu machen. Zwar fehlt seinen Mittheilungen der Schlussstein: die Andauer der Heilung, doch waren die von ihm beobachteten Erscheinungen von solcher Bedeutung, dass er ihre Bekanntmachung beschleunigt, um andere zu bestimmen, diese Versuche zu widerlegen.

Es heisst weiters: Das Jod hat sich bisher nicht als sicheres Heilmittel, wohl aber als der Tiernatur sehr gefährlich scheinender Stoff gezeigt. Da in Breslau Kröpfe und tiefer eingreifende Skrophelsucht sehr allgemein sind, hat E. hinreichende Gelegenheit, das Jod innerlich und äusserlich anzuwenden; doch der tiefe Eingriff in's vegetative Leben und die Verminderung der Lebenskraft, die das Mittel so oft, wenn nicht immer bedingt, nötigten ihn, nach mancher üblen Erfahrung von diesem Mittel abzugeben und er wendete es nicht mehr an, selbst als er die glücklichen Erfolge mit Jodkalium im Thomasspital zu London hörte. Nachdem er aber die Beobachtungen von Wallace über Behandlung der sekundären Syphilis mit Jodkalium erfahren, und die für dieses Mittel aufgestellten Ansichten geprüft hatte, beschloss er sogleich diese Methode anzuwenden und zwar um so mehr, als sich in seiner Behandlung mehrere Syphilitische befanden, bei denen der ganze Mercurial-Apparat in Anwendung gekommen, und die doch nicht geheilt worden waren, oder mehrfachen Rückfällen unterlegen hatten. Im Laufe der Abhandlung erzählt Verf. (Dr. Ebers) nun mehrere merkwürdige, von ihm mit Jodkalium behandelte Fälle, aus denen sich sattsam ergibt, dass dieses Mittel für die vielen Formen der sekundären Lues ein höchst kräftiges, wirksames Mittel ist. Bisher hat er dasselbe nur bei ganz verzweifelten Fällen gegeben, und die heftigsten Zufälle, und solche, die dem Quecksilber in allen Methoden widerstanden,

sind sehr schnell verschwunden. Weitere Beobachtung muss ergeben, ob die Heilung, wie sie cito et jucunde vor sich ging, auch tuto sein wird.

Erwägt man, dass krankhafte Formwucherungen, Knochengeschwülste, Drüsen-Anschwellungen, impetiginös-syphilitische Ausschläge und nächtliche Knochenschmerzen während Anwendung dieses Mittels sich schnell minderten, ja bald sich ganz verloren, und sieht man daneben, dass dieses Mittel, statt die Lebenskraft zu vermindern und der Ernährung zu schaden, die Gesundheit nach allen Richtungen erblühen macht, so entschliesst man sich gewiss, seine Wirksamkeit auch auf andere Weise zu versuchen. Bestätigt sich also die Wirkung dieses Mittels, so würde man in demselben ein Specificum gegen ein Uebel — und wäre es auch nur gegen bestimmte Formen sekundärer Lues — besitzen, welches das Quecksilber bald überflüssig machen müsste, ja, was noch wichtiger wäre, man hätte dann ein Mittel, das das Allgemeinbefinden zugleich befestigt, während das Quecksilber dem Körper stets feindlich entgegentritt.“

Von dieser Zeit ab finden wir in jedem Bande von Schmidt's Jahrbüchern irgend welchen Bericht über Jodkalium.

Anfangs der vierziger Jahre, 1844, stellte die ärztliche Gesellschaft zu Paris eine Preisfrage „Ueber die Anwendung des Kalijods bei der Behandlung von syphilitischen Krankheiten“, welche bis zum 1. Oktober 44 entschieden werden sollte. Wer den Preis davongetragen hat, ist unbekannt, doch legte ein Dr. P. A. Gauthier seine „observations pratiques sur le traitement des maladies syphilitiques par l'iodure de potassioime“ im Jahre 1845 der „medizinischen Welt“ vor, womit er eine vollständig hinreichende Abhandlung über fraglichen Gegenstand geliefert zu haben glaubte; doch hält diese Arbeit keinen Vergleich aus mit der Monographie des

Wiener Arztes Moj'sisovics „Erörterung der Umstände, unter denen das Jod heilsam oder schädlich wirkt“ (in den österreichischen Jahrbüchern) und von Dieterich „Zur Pharmakodynamik des Jod, namentlich des Jodkalium“, zwei umfassende Arbeiten, die in v. Graefe's und von Walther's Journal schon 1840 erschienen waren. —

Seit dieser Zeit nun ist über das Jodkalium, wie bereits erwähnt, fast jedes Jahr ein neuer Bericht, eine neue Abhandlung erschienen und kaum ein Mittel hat einen so ausgedehnten Gebrauch erfahren wie das Jodkalium.

Die unleugbare Wirkung bei verschiedenen Zuständen hat dazu geführt, es bei fast allen pathologischen Prozessen und zur Erfüllung der verschiedensten Indikationen zu benützen, ein um so erklärlicheres Verfahren, als bei dem Mangel jeder Einsicht in die physiologische Wirkungsweise und sich daraus ergebender Schlüsse der Wert oder Nichtwert des Mittels bei den verschiedenen Affektionen rein durch die Erfahrung bestimmt werden musste.

So berichtet 1836 Scheidenhauer über einen Fall von Bauchwassersucht, die mit Jodkalium behandelt wurde; eine zart gebaute Frau von 56 Jahren hat seit 3—4 Wochen eine Geschwulst am Leibe bemerkt, so dass derselbe einen Umfang wie im 7. bis 8. Monate der Gravidität hatte; nach 6 Tagen war durch Jodkalium die Wasser-Ansammlung entfernt und „die Kur beendet!“

1838 empfiehlt ein Marine-Wundarzt eine Salbe von 2 Drachmen Jodkalium + 1 Unze Fett gegen Hygrome, besonders die des Knies und sagt: „die mittlere Dauer der Behandlung „bis zur Heilung“ beträgt 14 Tage!“

So wird Anfangs der vierziger Jahre Jodkalium von zahlreichen Aerzten gegen die verschiedensten Krankheiten angewendet, angepriesen und anempfohlen gegen: Tuber-

kulose, Ekzem, Asthma, gegen Taubheit nach Scharlach, gegen alle möglichen Nervenkrankheiten; in der Augenheilkunde gegen Conjunctivitis diphtheritica, gegen Hornhaut-Trübungen u. s. w., in der Gynäkologie z. B. gegen Parametritis und vomitus gravidarum, in der Chirurgie vor allem gegen Struma, dann gegen Cystitis, Prostatahypertrophie; überall wurde Jodkalium angewendet und überall hat natürlich nur Jodkalium den Krankheitsprozess zum Stillstand gebracht.

Dass in der Anwendung des Jodkalium sozusagen ein Unfug getrieben wurde, das erhellt aus den Auslassungen eines Dr. Henoch, 1846, damals Assistenzarzt an dem kgl. poliklinischen Institut der Universität Berlin:

„Zu den Heilmethoden, welche als wirkliche, erst in neuerer Zeit gewonnene Bereicherungen unseres leider nur allzuviel Wulst bergenden Arzneischatzes betrachtet werden können, dürfte unzweifelhaft das Kalijod gehören. Zwar ist es auch diesem Mittel gegangen, wie so vielen anderen: man hat ihm bald, nachdem es in die ärztliche Praxis eingeführt worden, Wunderkräfte zugeschrieben, zum Glück ist es jedoch dadurch nicht um seinen Kredit gekommen, indem man bei Zeiten eingesehen, in welchen Fällen allein Heilwirkungen von ihm zu erwarten stehen. Dies sind nun hauptsächlich dyskrasische Zustände, und zwar ganz besonders diejenigen, welche auf einer skrophulösen oder tuberkulösen oder syphilitischen Basis beruhen. An sie reihen sich nach zahlreichen Erfahrungen chronische Leiden rheumatischer Natur, was den nicht überraschen wird, der die Analogie erwägt, die zwischen dem Rheumatismus und mancher Dyskrasie statthat. Doch würde man sehr irren, wenn man in allen Fällen von chronischem Rheumatismus auf Jodkali bauen wollte; denn nur, wenn die rheumatischen Schmerzen in den Muskeln

und den fibrösen Membranen ihren Sitz haben, entspricht dasselbe den von ihm gehegten Erwartungen, dagegen leistet es, wenn die Gelenke selbst ergriffen sind, fast niemals etwas. In einem Fall, der eine Frau von 53 Jahren betraf, welche angeblich seit dem vor 4 Jahren stattgehabten Verschwinden der Regeln an rheumatischen Schmerzen litt, die von der rechten Hüftgegend aus durch den Oberschenkel bis in die Gegend des Kniegelenkes und den Unterschenkel derselben Seite hinabstrahlten, bewirkte das Mittel innerhalb 4 Wochen vollständige Heilung.

Diese treffliche Wirkung beobachtete Verf. von dem Jodkali seitdem mehrmals unter ähnlichen Umständen, d. h. in Fällen, die ebenfalls mit dem Aufhören oder mit Unregelmässigkeiten der weiblichen Periode in ursächlichem Zusammenhange zu stehen scheinen. In der That gehören Beobachtungen von Schmerzen rheumatischer Natur aus der eben gedachten Ursache bei dem weiblichen Geschlecht, zumal in den klimakterischen Jahren, durchaus nicht zu den Seltenheiten; diese Schmerzen fixiren sich dann nicht auf einen bestimmten Teil, sondern ziehen im Körper herum.

Rp. Kalijod 6 gran 3mal täglich = $6 \times 0,06$ gramm.

So nun aus dem Angeführten erhellt, dass man in der Anwendung des Jodkali gewiss nicht skrupulös war, so sollen auch nicht Beweise dafür unangeführt bleiben, welche darthun, dass man nicht auch schon in jener Zeit bemüht war, einen Einblick in den Wirkungsmodus des so viel verwendeten Jodkali zu gewinnen, ja dass bereits schon im Jahre 1846 von einem Dr. Stubenrauch in Berlin experimentele Versuche über das Jodkalium an Kaninchen gemacht wurden in der Absicht, die Einwirkung des Kalium jodatum, da „das Vertrauen zu der grossen Wirksamkeit desselben immer mehr steigt“, physiologisch, chemisch und mikroskopisch nachzuweisen.

Die Resultate von Dr. Stubenrauch's Versuchen hier anzuführen, würde zu weit führen, und möchte ich nur noch hinweisen auf die Mittheilungen von Ricord 1860 „Ueber die physiologische Wirkung des Jodkalium“, von Bonnewyn 1861 „ein Fall von Vergiftung in Folge des Einnehmens von Jodkali“, und von Hermann Kämmerer 1874, der auf die von Hoppe-Seiler nachgewiesene Thatsache, dass der Sauerstoff im Blute in überaus loser Verbindung mit den roten Blutkörperchen steht, und eben solche chemische Reaktionen, als ob er im aktiven Zustande vorhanden sei, hervorzurufen vermöge, sich stützend, behauptet, dass das Jodkalium weder durch die Magensäure verändert, noch durch die im Darm vorhandenen Speisereste zersetzt wird, sondern durch Difussion als solches in das Blut gelangt und hier erst zu saurem kohlen-sauren Kali und Jodwasserstoff und weiter in Jod und Wasser verwandelt, beziehungsweise zersetzt wird.

Grosses Interesse erregte 1891 die Arbeit Sticker's „Wirkung des Jodkalium auf die Lungen Tuberkulöser“, in welcher er dem Jodkalium in diagnostischer und therapeutischer Beziehung eine ganz ähnliche Bedeutung zuweist, wie sie das Koch'sche Mittel besitzt.

Haben wir bislang gesehen, dass von der Zeit der Einführung des Jodkalium in den Arzneischatz dasselbe bis auf den heutigen Tag Gegenstand steter Erörterungen bezüglich seiner Anwendung und Wirkungsweise war, so ist dasselbe auch schon in frühester Zeit dazu benützt worden, seine Ausscheidungsfähigkeit zu prüfen!

Es ist dazu verwendet worden, um das Resorptionsvermögen der normalen menschlichen Haut und verschiedener Schleimhäute zu prüfen. Dasselbe ist zu diesem Zwecke vor allen anderen ähnlichen Stoffen ganz besonders gut geeignet, weil es kurz nach der Aufnahme in das Blut im Speichel und im Harn auftritt, und in

diesen Flüssigkeiten auf leichte Weise durch sichere, bequem ausführbare Reaktionen nachgewiesen werden kann.

Auf die Versuche, welche über die Ausscheidung des Jodkalium seit den dreissiger Jahren angestellt wurden, und die darauf gegründeten Thesen will ich nicht weiter eingehen; sehr zahlreiche Versuche wurden angestellt, sehr zahlreiche Thesen darauf gegründet; hat man dann bei einer Gabe von unter 3 jj Jodkalium dasselbe nicht nachweisen können, dann hatte das Jodkalium auf — „geheimen Wegen“ den Organismus verlassen!

Schon vor 17 Jahren hat Herr Professor Fleischer ermittelt, dass nach der Einführung von 0,005 bis 0,01 Jodkaliums in das Rectum, wenn Jodkalium in wenig Wasser gelöst war, bereits 5 Minuten später Jodkalium mit Chloroform und rauchender Salpetersäure einerseits, andererseits mit Stärkleister und rauchender Salpetersäure im Speichel nachweisbar war.

Man sieht daraus, dass schon ganz geringe Mengen jenes Salzes genügen, um nach der Resorption in das Blut im Speichel entdeckt zu werden.

Es sind ferner die genannten Reaktionen so ausserordentlich scharf und empfindlich, dass noch bei einer Verdünnung von 1,0 Jodkali bis zu einer Million Aqua destillata Jodkalium noch gerade deutlich erkannt werden kann.

Lässt sich also nach der Applikation einer viel grösseren Menge von Jodkalium als die vorhin genannte auf die normale menschliche Haut oder auf die Schleimhäute im Speichel und im Urin kein Jodkalium nachweisen, so beweist dies, dass die genannten Membranen Jodkalium nicht resorbirt haben.

Von den Schleimhäuten, bei welchen das Resorptionsvermögen derselben für Jodkalium in den letzten zwanzig

Jahren geprüft worden ist, sind vor allem zu nennen die Schleimhäute der menschlichen Nase, von der gleichzeitig Versuche angestellt worden sind von Maas und Pinner, sowie von Herrn Professor Fleischer; ferner die Schleimhäute des Mundes und des Rachens von Vierordt, und in späterer Zeit sind noch geprüft worden die Magenschleimhaut von Penzoldt und Faber (Erlangen), ausserdem das Resorptionsvermögen granulirender Flächen der Pleura und der Synovialhäute der Gelenke von verschiedenen Beobachtern.

Während ein Theil jener Beobachtungen zu rein wissenschaftlichen Zwecken angestellt wurden, haben andere auf die Resorptionsfähigkeit der Magenschleimhaut, der Blasenschleimhaut hin, praktische Feststellungen resp. praktische Zwecke verfolgt.

So ist z. B. durch vorher genannte Beobachter übereinstimmend festgestellt worden, dass die normale menschliche Blasenschleimhaut nur Spuren von Jodkalium zu resorbiren vermag, dass dagegen bei Geschwüren und ulcerirenden Carcinomen der Blase Jodkalium in grösserer Menge aufgenommen wird, so dass im Speichel Jod mit Leichtigkeit durch die früher erwähnten Reaktionen nachweisbar wird.

Man erhält somit durch jene Untersuchungs-Methoden und Resultate einen wichtigen Anhaltspunkt für die Diagnose schwer erkennbarer Blasenerkrankungen.

Die Untersuchungen von Penzoldt und Faber über das Resorptionsvermögen der normalen menschlichen Schleimhaut, die später auch auf den kranken Magen ausgedehnt wurden, haben gleichfalls ein grosses praktisches Interesse.

Z. B. die zahlreichen Beobachtungen, dass eine bestimmte Menge von Jodkalium in capsulis amylac. so eingeführt, dass eine Resorption des Jodkalium im Munde vermieden wird, sondern dass die Kapsel erst im

Magen gelöst wird, haben bewiesen, dass jedes Mal eine bestimmte Zeit später (die Grenzen der individuellen Schwankungen bei den verschiedenen Menschen lassen sich ja gleichfalls durch sorgfältige Versuche unter gleichen Bedingungen feststellen) Jodkalium im Speichel erscheint, und dehnt man später die Untersuchung auf Kranke mit carcinoma ventriculi, mit ulcus, mit chronischer und akuter Gastritis aus, so lässt sich, wenn deutliche Unterschiede bezüglich des Auftretens von Jodkalium im Speichel bei den verschiedenen Krankheiten nachweisbar sind, aus denselben ein wichtiger Anhalt für die Differentialdiagnose gewinnen.

Nach den erwähnten Untersuchungen von Penzoldt und Faber, die später von einzelnen anderen Autoren bestätigt wurden, von anderen allerdings wieder bestritten, schwankt bei normalen Menschen, welchen 0,2 Jodkali in capsulis amylaceis mit etwas Wasser in den nüchternen Magen eingeführt wurde, die Zeit des Erscheinens von Jodkalium im Speichel zwischen 4—12', während dagegen bei Carcinom namentlich und bei Gastræctasie unter gleichen Bedingungen Jod im Speichel erst viel später nachweisbar war: bei ulcus differiren die Resultate sowohl bei Penzoldt und Faber, wie auch diejenigen anderer Autoren ausserordentlich, und es ist das leicht begreiflich, wenn man bedenkt, dass je nach der Grösse und Beschaffenheit des Geschwürs, je nachdem in der Umgebung desselben ein geringerer oder grösserer Katarrh besteht, die Resorptionsbedingungen ausserordentlich schwanken, beziehungsweise wechseln.

Immerhin schien nach den bisherigen zahlreichen Untersuchungen die Methode geeignet zu sein, um das Resorptionsvermögen der normalen menschlichen Schleimhaut unter verschiedenen Einflüssen zu studieren.

Wenn auch die genannten Versuche nur für die Resorptionsfähigkeit der Magenschleimhaut bezüglich

Jodkalium allein beweisend sind, so ist doch der Schluss berechtigt, dass andere Krystalloide, in Wasser leicht lösliche Substanzen, wie z. B. Kochsalz, die phosphorsauren Salze, das salzsaure Pepton, der Zucker, deren Aufsaugung im Magen für den Arzt von grossem Interesse ist, sich ähnlich verhalten, wie das Jodkalium.

Ich habe meine Versuche auf Veranlassung resp. nach Angabe des Herrn Professor Fleischer in der Weise angestellt, dass ich die betreffenden Dosen Jodkalium in capsulis gelatinosis mit dem letzten Schluck der betreffenden Versuchs-Flüssigkeiten oder wie nach dem Essen mit Wasser verschlucken liess; die Versuchs-Personen liess ich von Minute zu Minute spucken und setzte zum betreffenden Sekret einen Tropfen von Acidum nitricum fumans; ich vermerkte bei meinen Versuchen stets den Beginn der Jodreaction, der sich durch Bildung eines rötlichen Randes rings um das auf Stärkekleisterpapier deponirte sputum nach Zusatz oben erwähnten Tropfens rauchender Salpetersäure kennzeichnete.

Die folgenden Versuche sind nun in der Absicht unternommen, mit der eben genannten Methode festzustellen, ob das Jodkalium, wenn es in grösseren oder kleineren Mengen in den Magen eingeführt wird, langsamer oder schneller im Speichel nachweisbar ist; ferner wurde geprüft, ob, wenn das Jodkalium mit kalten oder warmen Flüssigkeiten, mit kohlensäurehaltigen Getränken, ferner mit Alcoholicis zugeführt wird, irgend ein Einfluss auf die Schnelligkeit der Resorption unter genannten Bedingungen nachweisbar ist. Bekanntlich wirkt die Kohlensäure sehr reizend und hyperämisirend auf die Magenschleimhaut ein, und es war deshalb anzunehmen, dass bei Gegenwart derselben im Magen das Jodkalium schneller als sonst resorbirt wird.

Das gleiche war zu erwarten, wenn Jodkalium zusammen mit alkoholhaltigen Flüssigkeiten in den Magen eingeführt wurde, einerseits, weil Alkohol nach den bisherigen Versuchen sehr schnell im Magen aufgesaugt wird und Jodkalium in diesem löslich ist, andererseits, weil der Alkohol eine Hyperämie der Magenschleimhaut veranlasst, die günstigere Bedingungen für die Resorption schafft.

Es wurde ferner festzustellen gesucht, ob die Art und Menge der Nahrung, mit welcher das Jodkalium genommen wurde, irgend einen Einfluss auf die Schnelligkeit der Resorption im Magen hat, und ob das letztere schneller vom nüchternen oder von dem in der Verdauung begriffenen Magen aufgenommen wurde. Gelingt es nachzuweisen, dass das genannte Salz unter bestimmten Bedingungen viel schneller aufgenommen wird und in das Blut gelangt als unter anderen, so hat dieses Resultat für den prakt. Arzt einen praktischen Wert in allen jenen Fällen, in welchen derselbe eine möglichst schnelle Aufnahme des Jodkalium in den Magen, beziehungsweise Resorption zu erzielen wünscht.

Ob die Menge des eingeführten Jodkalium einen Einfluss auf die Schnelligkeit der Resorption im Magen ausübt, ist mir nach meinen erhaltenen Resultaten zweifelhaft; die Unterschiede in den Reaktionszeiten sind sehr geringe und liegen innerhalb der individuellen Fehlergrenzen.

Vd. „Kalter Kafee“ u. „nach dem Essen“.

Was den Einfluss der Kohlensäure betrifft, so habe ich mehrere Versuche angestellt, bei welchen Jodkalium in Dosen von 0,15 gleichzeitig mit Weisswein und Apollinaris zu gleichen Teilen ohne feste Speisen im Laufe des Vormittags genossen wurde. Aus der Tabelle

lässt sich nicht der Schluss ziehen, dass die Kohlensäure und der Weisswein die Resorption des Jodkalium in konstanter Weise beschleunigen: nur ein einzig Mal tritt Jod im Speichel nach der Darreichung von Jodkalium in 9 auf, ferner ein einziges Mal nach 10'; sonst schwankt die Zeit zwischen $11\frac{1}{2}$ —32' und es sind die individuellen Schwankungen so ausserordentlich gross auch bei denselben Versuchspersonen, dass ein sicherer Schluss aus den Resultaten nicht gezogen werden kann.

Bei den Versuchen, bei welchen Mosel-Wein allein ohne Apollinaris genommen wurde, scheint allerdings bei einzelnen Versuchen, bei welchen keine festen Speisen gleichzeitig eingeführt wurden, die Resorptionszeit etwas abgekürzt zu sein, doch sind auch hier die Schwankungen bei denselben als auch bei verschiedenen Personen so ausserordentlich grosse, dass aus den Versuchen ein sicherer Schluss nicht ableitbar ist.

Das gleiche trifft zu für die Versuche mit Rotwein, die deshalb schon schwierig waren, weil der Rotwein den Speichel färbt und so leicht eine Jod-Reaktion vorgetäuscht wird.

Die Versuche, welche ich ferner anstellte, um zu prüfen, ob die Wärme oder Kälte des mit dem Jodkalium eingeführten Getränkes die Resorptionsdauer beeinflusst, ergaben, dass auch hier keine konstanten und so prägnanten Unterschiede in dem zeitlichen Auftreten des Jodkalium im Speichel zu entdecken sind, so dass jedenfalls die Temperatur ohne grössere Einwirkung der Resorption im Magen ist.

Die gleichen Resultate ergaben die Versuche mit kaltem und warmem Thee, und ebenso übte ein Zusatz von Arac zu den verschiedenen Flüssigkeiten auf das kurze oder langsame Auftreten keine konstante Einwirkung aus.

Aus der Tabelle, bei der das Jodkalium nüchtern, und aus derjenigen, bei welcher es nach dem Essen zugeführt wurde, stimmen die Zahlen besser überein, wenn auch bei einzelnen grössere Schwankungen vorkommen, und es scheint, wenn man die Resultate mit früheren Tabellen vergleicht, dass während der Verdauung (wenn man das Mittel aus einer grösseren Anzahl von Versuchen zieht) das Jodkalium etwas schneller resorbirt wird als bei nüchternem Magen.

Resumiren wir die Resultate der gewiss zahlreichen Versuche, so lässt sich mit Bestimmtheit sagen, dass unsere Erwartungen, es möge sich durch die angewandte Methode ein konstanter Einfluss der verschiedenen Versuchsbedingungen auf die Schnelligkeit der Resorption des Jodkalium im Magen nachweisen lassen, sich nicht erfüllt haben: vielmehr geht aus den Versuchen hervor, dass zahlreiche und zum Teil unbekannte Einflüsse, z. B. der Blutdruck in den Magen Gefässen, der Wassergehalt des Blutes, die Art der Diurese, und nicht zum wenigsten der Einfluss des Nervensystems bei der Resorption des Jodkalium im Magen eine hochbedeutsame Rolle spielt, da sonst unmöglich bei ganz gleichen Versuchs-Bedingungen und bei denselben Versuchspersonen die Schwankungen so ausserordentlich gross sein könnten.

Am Schlusse meiner Arbeit angelangt, sei es mir gestattet, meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Professor Dr. R. Fleischer, für die Anregung zu vorstehender Arbeit, sowie für die mir bei der Durchführung derselben gegebenen Ratschläge meinen tiefsten Dank auszusprechen!

Versuche mit Jodkalium in capsul. gelat. 0,15 nach kaltem Thee.

No.	Datum	Person		Zeit der Aufnahme	Erste Reaktion	also nach	Bemerkungen
		Name	Alter				
1	10. XI.	Deimel, Klara	Jahr 23	2h 57 ³ / ₄ '	3h 16'	18 ¹ / ₄ '	Nachmittags: mit dem letzten Schluck.
2	10. XI.	Böhm, Adolf	30	3h 33'	3h 51'	18 ¹ / ₄ '	
3	21. XI.	Deimel, Klara	23	3h 35'	4h 47'	1h 12'	No. 1-5 inkl. kalter Thee mit Zucker (ohne Milch) ohne Brot.
4	21. XI.	Gumberger, Babette	28 ¹ / ₂	3h 40 ¹ / ₂ '	4h 01'	20 ¹ / ₂ '	
5	21. XI.	Barth, Anna	15 ¹ / ₂	4h 15'	4h 30'	15'	No. 6-8 inkl. Thee mit Zucker (ohne Milch).
6	30. I.	Deimel, Klara	23	3h 42'	3h 55'	13'	
7	30. I.	Gumberger, Babette	28 ¹ / ₂	3h 54'	4h 51'	57'	No. 6 mit Faschingskrapfen. No. 7 und 8 mit je einem sog. Weckerl.
8	30. I.	Barth, Anna	15 ¹ / ₂	3h 54'	4h 10'	16'	

Versuche mit Jodkalium in capsul. gelat. 0,15 nach warmem Thee.

No.	Datum	Person		Zeit der Aufnahme	Erste Reaktion	also nach	Bemerkungen
		Name	Alter				
1	20. X.	Deinzel, Klara	Jahr 23	11h 44'	11h 52'	8'	Des Morgens: mit dem letzten Schluck. ad No. 1 und 8 etliche Stunden vorher als (erstes) Morgenfrühstück 1 Tasse Café (mit Milch) mit 1 Brot genommen; der Thee wurde beidesmal mit etwas Milchzusatz, ohne Brot genommen. No. 2, 3, 6, 7, 9 Thee mit Milchzusatz und 2 Brötchen. No. 4 u. 5 und 10 u. 11 Thee mit Milch ohne Brot etc. No. 12 Soldat kam „nach seiner Aussage“ nüchtern von der Kaserne; 1 Tasse Thee mit Milch und 2 Theelöffel Arac (de Bactiva), dazu ein Brot. No. 13 und 14 1 Tasse Thee mit Milch und Zucker und 2 Broten (weisen).
2	7. XI.	Gumbberger, Babette	28 ^{1/2}	9h 55'	10h 13'	18'	
3	7. XI.	Barth, Anna	15 ^{1/2}	9h 55'	10h 18'	23'	
4	7. XI.	Böhm, Adolf	30	9h 52'	10h 04 ^{1/2} '	12 ^{1/2} '	
5	9. XI.	Böhm, Adolf	30	9h 39'	9h 50 ^{1/2} '	11 ^{1/2} '	
6	9. XI.	Barth, Anna	15 ^{1/2}	9h 41'	10h 30'	49'	
7	9. XI.	Gumbberger, Babette	28 ^{1/2}	9h 40'	10h 10'	30'	
8	13. XI.	Deinzel, Klara	23	9h 45 ^{1/2} '	9h 55'	09 ^{1/2} '	
9	13. XI.	Barth, Anna	15 ^{1/2}	10h 01'	10h 48'	47'	
10	13. XI.	Böhm, Adolf	30	10h 14 ^{1/2} '	10h 28'	13 ^{1/2} '	
11	20. XI.	Böhm, Adolf	30	8h 37'	8h 44'	7'	
12	26. XII.	Dörfner, Soldat		8h 26'	8h 36 ^{1/2} '	10 ^{1/2} '	
13	28. I.	Gumbberger, Babette		9h 40'	9h 51 ^{1/2} '	19 ^{1/2} '	
14	28. I.	Barth, Anna		9h 40'	9h 47 ^{1/2} '	7 ^{1/2} '	

Versuche mit Jodkalium in capsul. gelatin. 0,15 nach warmem Thee.

No.	Datum	Person		Zeit der Aufnahme	Erste Reaktion	also nach	Bemerkungen
		Name	Alter				
1	7. XI.	Deimel, Klara	Jahr 23	4 h 21 ¹ / ₂	4 h 39'	17 ¹ / ₂	Nachmittags: mit dem letzten Schluck. No. 1—10 incl. Thee mit Milch ohne Brot. No. 11 u. 12 Thee mit Arac ohne Milch und ohne Brot. No. 13 u. 14 Thee mit Milch ohne Brot. No. 15 Thee mit Milch und Arac ohne Brot. No. 16, 17 u. 19 Thee mit Milch ohne Brot. No. 18 Thee mit Milch und Arac ohne Brot. No. 20, 21 u. 22 Thee mit Milch ohne Brot.
2	27. XI.	Barth, Anna	15 ¹ / ₂	3 h 17'	3 h 37'	20'	
3	27. XI.	Gumberger, Babette	28 ¹ / ₂	3 h 16 ¹ / ₂	3 h 36'	19 ¹ / ₂	
4	2. XII.	Dr. Magnus, Fritz	30	3 h 45'	4 h 28'	43'	No. 11 u. 12 Thee mit Arac ohne Milch und ohne Brot. No. 13 u. 14 Thee mit Milch ohne Brot. No. 15 Thee mit Milch und Arac ohne Brot. No. 16, 17 u. 19 Thee mit Milch ohne Brot. No. 18 Thee mit Milch und Arac ohne Brot. No. 20, 21 u. 22 Thee mit Milch ohne Brot.
5	2. XII.	Böhm, Adolf	30	3 h 45'	3 h 59'	14'	
6	13. XII.	Muthherr, Mina (Zwillinge)	13 ¹ / ₂	4 h 09'	4 h 21'	12'	
7	13. XII.	Muthherr, Anna (Zwillinge)	13 ¹ / ₂	4 h 09'	4 h 26'	13'	No. 11 u. 12 Thee mit Arac ohne Milch und ohne Brot. No. 13 u. 14 Thee mit Milch ohne Brot. No. 15 Thee mit Milch und Arac ohne Brot. No. 16, 17 u. 19 Thee mit Milch ohne Brot. No. 18 Thee mit Milch und Arac ohne Brot. No. 20, 21 u. 22 Thee mit Milch ohne Brot.
8	22. XII.	Deimel, Klara	30	3 h 56 ¹ / ₂	4 h 08 ¹ / ₂	13'	
9	22. XII.	Gumberger, Babette	28 ¹ / ₂	3 h 57'	4 h 10'	12'	
10	22. XII.	Barth, Anna	15 ¹ / ₂	3 h 59'	4 h 12'	17'	No. 11 u. 12 Thee mit Arac ohne Milch und ohne Brot. No. 13 u. 14 Thee mit Milch ohne Brot. No. 15 Thee mit Milch und Arac ohne Brot. No. 16, 17 u. 19 Thee mit Milch ohne Brot. No. 18 Thee mit Milch und Arac ohne Brot. No. 20, 21 u. 22 Thee mit Milch ohne Brot.
11	25. XII.	Muthherr, Mina (Zwillinge)	13 ¹ / ₂	4 h 54 ¹ / ₂	5 h 06 ¹ / ₂	11'	
12	25. XII.	Muthherr, Anna (Zwillinge)	13 ¹ / ₂	4 h 55 ¹ / ₂	4 h 18 ¹ / ₂	23'	
13	31. XII.	Muthherr, Mina (Zwillinge)	13 ¹ / ₂	4 h 00'	4 h 14'	14'	No. 11 u. 12 Thee mit Arac ohne Milch und ohne Brot. No. 13 u. 14 Thee mit Milch ohne Brot. No. 15 Thee mit Milch und Arac ohne Brot. No. 16, 17 u. 19 Thee mit Milch ohne Brot. No. 18 Thee mit Milch und Arac ohne Brot. No. 20, 21 u. 22 Thee mit Milch ohne Brot.
14	31. XII.	Muthherr, Anna (Zwillinge)	13 ¹ / ₂	4 h 00'	4 h 30'	30'	
15	31. XII.	Deimel, Klara	23	4 h 02'	4 h 13 ¹ / ₂	11 ¹ / ₂	
16	7. I.	Muthherr, Mina (Zwillinge)	13 ¹ / ₂	2 h 30'	2 h 45'	15'	No. 11 u. 12 Thee mit Arac ohne Milch und ohne Brot. No. 13 u. 14 Thee mit Milch ohne Brot. No. 15 Thee mit Milch und Arac ohne Brot. No. 16, 17 u. 19 Thee mit Milch ohne Brot. No. 18 Thee mit Milch und Arac ohne Brot. No. 20, 21 u. 22 Thee mit Milch ohne Brot.
17	7. I.	Muthherr, Anna (Zwillinge)	13 ¹ / ₂	2 h 30'	2 h 46 ¹ / ₂	16 ¹ / ₂	
18	7. I.	Deimel, Klara	23	2 h 30'	2 h 42 ¹ / ₂	12 ¹ / ₂	
19	7. I.	Gumberger, Babette	28 ¹ / ₂	2 h 28'	2 h 56'	28'	No. 11 u. 12 Thee mit Arac ohne Milch und ohne Brot. No. 13 u. 14 Thee mit Milch ohne Brot. No. 15 Thee mit Milch und Arac ohne Brot. No. 16, 17 u. 19 Thee mit Milch ohne Brot. No. 18 Thee mit Milch und Arac ohne Brot. No. 20, 21 u. 22 Thee mit Milch ohne Brot.
20	14. I.	Muthherr, Mina (Zwillinge)	13 ¹ / ₂	2 h 30'	2 h 44'	14'	
21	14. I.	Muthherr, Anna (Zwillinge)	13 ¹ / ₂	2 h 30'	2 h 43 ¹ / ₂	13 ¹ / ₂	
22	14. I.	Deimel, Klara	23	2 h 30'	2 h 42'	12'	

No.	Datum	Person		Zeit der Aufnahme	Erste Reaktion	also nach	Bemerkungen.
		Name	Alter				
1	18. XII.	Deimel, Klara	Jahr 23	11 h 30'	11 h 38'	8'	Moselwein pur: No. 1 — 4 Moselwein pur ohne Brot etc.
2	18. XII.	Böhm, Adolf	30	11 h 46'	11 h 54 ¹ / ₂ '	8 ¹ / ₂ '	
3	18. XII.	Muthherr, Wilhelmine	13 ¹ / ₂	11 h 31'	11 h 45'	14'	
4	18. XII.	Muthherr, Anna	13 ¹ / ₂	11 h 31'	11 h 42'	11'	
5	17. I.	Süppel, Andreas		10 h 39'	10 h 57 ³ / ₄ '	18 ³ / ₄ '	No. 5 Moselwein pur ohne jegliches.
6	19. I.	Levinski, Leopold		10 h 25 ¹ / ₂ '	10 h 39 ¹ / ₂ '	14'	No. 6 Moselwein pur ohne jegliches.
7	23. I.	Dr. Neumaier, Hans	23	10 h 29'	10 h 57 ¹ / ₂ '	28 ¹ / ₂ '	No. 7, 8, 9 Moselwein pur bei gleichzeitigem Genuss von 2 Würstchen und 1 Brot.
8	23. I.	Ascherl, Wenzel		10 h 28'	10 h 46'	18'	No. 10 hat zu ca. 2 ¹ / ₂ Moselwein pur eine Portion Frankfurter-Leber-Wurst und 1 Brot genommen.
9	23. I.	Böhm, Adolf		10 h 30'	10 h 46'	16'	
10	24. I.	Nurmberger		11 h 11'	11 h 30'	19'	
11	24. I.	Levinski		11 h 34'	11 h 07'	33'	
12	24. I.	Böhm		11 h 11 ¹ / ₂ '	11 h 25'	13 ¹ / ₂ '	No. 11 hatte sein Frühstück (erstes) um ca. 2 h vorher genommen, bestehend aus 1 Tasse schwarzen Café mit Käs auf Buttersemmel.
13	24. I.	Süppel, Andreas		11 h 13 ¹ / ₂ '	11 h 32 ¹ / ₂ '	19'	
14	27. I.	Deimel, Klara	23	10 h 33'	10 h 44'	11'	No. 12 hatte vor ca. 2 h 1 Tasse Café mit Milch ohne Brot genommen. No. 13 als 1. Frühstück 1 Tasse Café mit Milch und 1 Brod. No. 14 zum Wein kalten Aufschnitt, und nach Kapsel-Aufnahme bis zum R.-Eintritt Wein fortgenommen.

Versuche mit Jodkalium in capsul. gelat. 0,15 nach Weiss-Wein.

No.	Datum	Person		Zeit der Aufnahme	Erste Reaktion	also nach	Bemerkungen.
		Name	Alter				
1	27. XI.	Deimel, Klara	Jahr 23	12h 31'	1h	29'	Moselwein mit Apollinaris zu gleichen Teilen. No 1-14 Moselwein mit Apollin. im Laufe des Vormittags ohne Brot etc.
2	7. XII.	Deimel, Klara	23	10h 44'	10h 58'	14'	
3	7. XII.	Muthherr, Mina (Zwillinge)	13 ^{1/2}	11h 21'	11h 38 ^{1/2} '	17 ^{1/2} '	
4	7. XII.	Muthherr, Anna (Zwillinge)	13 ^{1/2}	11h 21'	11h 40'	19'	
5	7. XII.	Böhm, Adolf	30	11h 10 ^{1/2} '	11h 22'	11 ^{1/2} '	
6	9. XII.	Muthherr, Mina (Zwillinge)	13 ^{1/2}	12h 40'	12h 58'	18'	
7	9. XII.	Muthherr, Anna (Zwillinge)	13 ^{1/2}	12h 40'	12h 54'	14'	
8	11. XII.	Deimel, Klara	23	11h 16'	11h 28'	12'	
9	16. XII.	Deimel, Klara	23	10h 13'	10h 23'	10'	
10	24. XII.	Gärtner, Soldat		10h 25'	10h 57'	32'	
11	24. XII.	Dörfner, Soldat		10h 23'	10h 37'	14'	
12	24. XII.	Böhm, Adolf	30	10h 23'	10h 34 ^{1/2} '	11 ^{1/2} '	
13	25. XII.	Gumburger, Babette	28 ^{1/2}	11h 18'	11h 32'	14'	
14	29. XII.	Deimel, Klara	23	12h 06'	12h 15'	9'	

Versuche mit Jodkalium in capsul. gelat. 0,15 nach Rot-Wein.

No.	Datum	Person		Zeit der Aufnahme	Erste Reaktion	also nach	Bemerkungen.
		Name	Alter				
1	21. XII.	Muthherr, Mina	Jahr 13 ^{1/2}	11h 13'	11h 23'	10'	Rotwein pur: Wegen der Schwierigkeit das deutliche Vorhandensein der Reaktion zu erkennen und der daraus resultierenden Unzuverlässigkeit betreff wirklich richtiger Angabe der Zeit des Reaktions-Eintrittes beschränke ich mich auf bezeichnende 14 Fälle. No. 1 u. 2 Erlauer pur ohne Brot etc. No. 3 " " " " " No. 4 " " " " " No. 5—7 incl. Erlauer pur ohne Brot etc.
2	21. XII.	Muthherr, Anna	13 ^{1/2}	11h 13'	11h 25'	12'	
3	18. I.	Süppel, Andreas	23	11h 19'	11h 34'	15'	
4	25. I.	Dr. Neumaier, Hans	30	10h 30'	10h 55'	25'	
5	3. II.	Böhm, Adolf	15 ^{1/2}	11h 23'	11h 33'	10'	
6	3. II.	Barth, Anna	23	10h 59'	11h 15 ^{1/2} '	16 ^{1/2} '	
7	3. II.	Deimel, Klara		10h 52'	11h 01'	9'	
1	27. XI.	Böhm, Adolf	30	12h 30 ^{1/2} '	12h 45'	14 ^{1/2} '	Rotwein mit Apollinaris. No. 1—7 incl. ca. 2 Schoppen zu gleichen Teilen gemischt; ohne Brot etc. Die Versuche wurden vor dem Essen gemacht. No. 2—7 Schulmädchen, kamen direkt von der Schule.
2	11. XII.	Muthherr, Mina		11h 21'	11h 38'	17'	
3	11. XII.	Muthherr, Anna		11h 21'	11h 32'	11'	
4	15. XII.	Muthherr, Mina		12h 16'	12h 30'	14'	
5	15. XII.	Muthherr, Anna	13 ^{1/2}	12h 16'	12h 30'	14'	
6	29. XII.	Muthherr, Mina		12h 18'	12h 32 ^{1/2} '	14 ^{1/2} '	
7	29. XII.	Muthherr, Anna		12h 18'	12h 35'	17'	

Versuche mit Jodkalium in capsul. gelat. nach kaltem Café.

No.	Datum	Person		Dosis	Zeit der Aufnahme	Erste Reaktion	also nach	Bemerkungen
		Name	Alter					
1	23. X.	Gumberger, Babette	Jahr 28 $\frac{1}{2}$	0,3	4 h 38'	4 h 52 $\frac{1}{2}$ '	14 $\frac{1}{2}$ '	Nachmittags: mit dem letzten Schluck. No. 1—5 an Café gewöhnt mit 2 Brot. No. 6 mit 1 Brot. No. 7—10 ohne Brot. No. 11—15 mit 1 Brot. No. 16, 17 u. 18 ohne Brot. No. 19 u. 20. Die Versuche wurden sämtliche mit Milchcafé, gezuckerten, d. h. mit Zuckerzusatze genommen; No. 19 u. 20 mit je $\frac{1}{2}$ Weckerl.
2	23. X.	Sanderski	45	0,3	5 h 40'	5 h 52 $\frac{1}{2}$ '	12 $\frac{1}{2}$ '	
3	23. X.	Barth, Anna	15 $\frac{1}{2}$	0,3	4 h 39 $\frac{1}{2}$ '	4 h 52'	12 $\frac{1}{2}$ '	
4	31. X.	Muthherr, Wilhelmine	13 $\frac{1}{2}$	0,15	4 h 29'	4 h 43'	14'	
5	31. X.	Muthherr, Kuni	10 $\frac{1}{2}$	0,15	4 h 29 $\frac{1}{2}$ '	4 h 48 $\frac{1}{2}$ '	19'	
6	1. XI.	Sanderski	45	0,15	4 h 42'	4 h 52 $\frac{1}{2}$ '	10 $\frac{1}{2}$ '	
7	1. XI.	Muthherr (Mutter)	50	0,15	4 h 42 $\frac{1}{2}$ '	4 h 51 $\frac{1}{2}$ '	9'	
8	2. XI.	Muthherr, Kuni	10 $\frac{1}{2}$	0,15	5 h 55'	6 h 20'	25'	
9	3. XI.	Gumberger, Babette	28 $\frac{1}{2}$	0,15	5 h 23'	5 h 35'	12'	
10	3. XI.	Barth, Anna	15 $\frac{1}{2}$	0,15	5 h 23'	5 h 37 $\frac{1}{2}$ '	14 $\frac{1}{2}$ '	
11	3. XI.	Hammer, Soldat		0,15	6 h 35 $\frac{1}{2}$ '	6 h 41'	5 $\frac{1}{2}$ '	
12	14. XI.	Muthherr, Mina (Zwilling)	13 $\frac{1}{2}$	0,15	3 h 57'	4 h 12'	15'	
13	14. XI.	Muthherr, Anna (linge)		0,15	3 h 57 $\frac{1}{2}$ '	4 h 17'	19 $\frac{1}{2}$ '	
14	15. XI.	Barth, Anna	15 $\frac{1}{2}$	0,15	4 h 01'	4 h 13'	12'	
15	15. XI.	Gumberger, Babette	28 $\frac{1}{2}$	0,15	4 h 03'	4 h 23'	20'	
16	30. XI.	Süppel, Andreas		0,15	3 h 04'	3 h 25'	21'	
17	3. XII.	Muthherr, Mina (Zwilling)	13 $\frac{1}{2}$	0,15	3 h 44'	4 h 10'	26'	
18	3. XII.	Muthherr, Anna (linge)		0,15	3 h 44'	4 h 15'	31'	
19	26. I.	Gumberger, Babette	28 $\frac{1}{2}$	0,15	4 h 57'	5 h 26'	29'	
20	26. I.	Barth, Anna	15 $\frac{1}{2}$	0,15	4 h 57'	5 h 24'	27'	

No.	Datum	Person		Dosis	Zeit der Aufnahme	Erste Reaktion	also nach	Bemerkungen
		Name	Alter					
1	30. X.	Muthherr (Mutter)	Jahr	0,3	8 h 22'	8 h 34'	12'	Des Morgens: mit dem letzten Schluck.
2	30. X.	Gumbberger, Babette	50	0,3	8 h 22'	8 h 32 1/2'	14 1/2'	
3	30. X.	Sanderski	28	0,3	8 h 44'	9 h 12'	28'	No. 1, 2 u. 3 Putzerinnen, an Café sehr gewöhnt, teilweise neben Brot resp. mit Brot Haupt-Nahrungsmittel.
4	30. X.	Böhm, Adolf	45	0,3	8 h 28'	9 h 35'	7'	
5	6. XI.	Böhm, Adolf	30	0,15	9 h 39'	9 h 54'	15'	No. 4, 5, 6 u. 7 Café ungewohnt, ohne Brot.
6	25. XII.	Deimel, Joseph	59	0,15	9 h 47 3/4'	9 h 53'	5 1/4'	
7	6. X.	Böhm, Adolf	30	0,2	8 h 04'	8 h 16'	12'	No. 8 u. 9 jede Person 1 Brot; R. war 9 h 15' noch nicht vorhanden.
8	1. I.	Gumbberger, Babette	28	0,15	8 h 58'	9 h 30'	32'	
9	1. I.	Barth, Anna	15 3/4	0,15	8 h 58'	vd. Bemerkung	vd. Bemerkung	No. 10 Milch und Zucker als Zusatz, ohne Brot.
10	1. I.	Böhm, Adolf	30	0,15	9 h	9 h 11 1/2'	11 1/2'	
11	9. I.	Gumbberger, Babette	28	0,15	8 h 01'	8 h 22'	21'	No. 11 u. 12 mit Milch u. Zucker und 2 Brot (= Semmeln).
12	9. I.	Barth, Anna	16	0,15	8 h 01'	8 h 08'	7'	
13	9. I.	Deimel, Klara	23	0,15	9 h 50'	10 h 12'	22'	No. 13 hatte den Café (1 Tasse) nebst 1/2 Brötchen ca. 20' vorher genommen; die Kapsel wurde mit Milch geschluckt.
14	14. I.	Böhm, Adolf	30	0,15	9 h 13'	9 h 29 1/2'	16 1/2'	
15	14. I.	Dr. Neumaier, Hans	23	0,15	9 h 13'	9 h 30 1/2'	17 1/2'	No. 14 1 Tasse mit Milch und 1 Brötchen.
16	14. I.	Gumbberger, Babette	28	0,15	9 h 38'	10 h 03'	25'	
17	14. I.	Barth, Anna	16	0,15	9 h 38'	10 h 35'	57'	No. 15 1 Tasse mit Milch und 1/2 Brötchen.
18	16. I.	Gumbberger, Babette	28	0,15	8 h 21'	9 h 28'	67'	
19	16. I.	Barth, Anna	16	0,15	8 h 21'	9 h 02'	41'	No. 16 1 Tasse mit Milch und 2 Brötchen.
								No. 17 1 Tasse mit Milch und 2 Brötchen.

Versuche mit Jodkalium in capsul. gelat. nach warmem Café.

No.	Datum	Person		Dosis	Zeit der Aufnahme	Erste Reaktion	also nach	Bemerkungen
		Name	Alter					
1	29. IX.	Deimel, Klara	Jahr 23	0,3	2h 34'	2h 40'	6'	Nachmittags: mit dem letztem Schluck. No. 1 ein Stück Käskuchen. No. 2 ein Stück Apfelkuchen. No. 3, 4, 5, 6 1 Brot.
2	2. X.	Wernsdorfer, Heinrich	38	0,3	3h 28'	3h 44 $\frac{1}{2}$ '	16 $\frac{1}{2}$ '	
3	6. X.	Schwab	37	0,2	2h 18'	2h 22'	4'	
4	6. X.	Deimel, Klara	23	0,2	3h 18 $\frac{1}{2}$ '	3h 31'	12 $\frac{1}{2}$ '	
5	6. X.	Barth, Anna	15 $\frac{1}{2}$	0,2	3h 17'	3h 30'	13'	No. 8 u. 11 Zwetschkuchen. No. 7, 9, 10 Apfelkuchen. No. 12 u. 14 ohne Brot. No. 13 u. 15 mit 2 Brot. No. 16 ohne Brot.
6	6. X.	Thunecke, Marie	71 $\frac{1}{4}$	0,2	3h 52'	4h 03'	11'	
7	8. X.	Thunecke, Marie	71 $\frac{1}{4}$	0,2	3h 17'	3h 35'	18'	
8	8. X.	Schlick, Jetta	12 $\frac{1}{2}$	0,2	3h 17'	3h 35'	18'	
9	8. X.	Schlick, Marie	11	0,2	3h 17'	3h 37'	20'	No. 12 u. 14 ohne Brot. No. 13 u. 15 mit 2 Brot. No. 16 ohne Brot.
10	8. X.	Thunecke, Gretchen	10 $\frac{1}{2}$	0,2	3h 17'	3h 32'	15'	
11	8. X.	Thunecke, Tina	11 $\frac{1}{2}$	0,2	3h 17'	3h 44'	27'	
12	16. X.	Deimel, Klara	23	0,15	4h 01'	4h 09'	8'	
13	16. X.	Barth, Anna	15 $\frac{1}{2}$	0,15	4h 05'	4h 17'	12'	No. 17—48 inkl. ohne Brot.
14	25. X.	Deimel, Klara	23	0,15	4h 52'	4h 58'	6'	
15	25. X.	Gumberger, Babette	28	0,15	5h 03'	5h 15'	12'	
16	30. X.	Muthherr, Kuni	10 $\frac{1}{2}$	0,15	4h 25 $\frac{1}{2}$ '	4h 36'	10 $\frac{1}{4}$ '	
17	31. X.	Muthherr, Johanne	19	0,15	1h 59'	2h 15 $\frac{1}{2}$ '	16 $\frac{1}{2}$ '	
18	31. X.	Sanderski, Margaretha	17 $\frac{1}{2}$	0,15	1h 57 $\frac{1}{2}$ '	2h 12'	14 $\frac{1}{2}$ '	
19	3. XI.	Gärtner, Soldat		0,15	6h 48'	7h 03 $\frac{1}{2}$ '	15 $\frac{1}{2}$ '	
20	3. XI.	Bickel, Soldat		0,15	6h 48'	7h 12 $\frac{1}{2}$ '	24 $\frac{1}{2}$ '	
21	3. XI.	Dörfler, Soldat		0,15	6h 48'	7h 03 $\frac{1}{2}$ '	15 $\frac{1}{2}$ '	
22	3. XI.	Hühnerkopf, Christian		0,15	3h 57 $\frac{1}{2}$ '	4h 16 $\frac{1}{4}$ '	19 $\frac{3}{4}$ '	

23	3. XI.	Muthherr, Mina } Zwi-	13 ¹ / ₂	0,15	3h 57 ¹ / ₂	4h 27'	29 ¹ / ₂
24	3. XI.	Muthherr, Anna } linge	13 ¹ / ₂	0,15	3h 57 ¹ / ₂	4h 14 ¹ / ₂	17'
25	4. XI.	Bär, Hans	49	0,15	4h 15'	4h 28'	13'
26	4. XI.	Bär, Richard	14	0,15	4h 26'	4h 58 ¹ / ₂	32 ¹ / ₂
27	4. XI.	Hühnerkopf, Christian,		0,15	4h 13 ¹ / ₄	4h 34 ¹ / ₂	21 ¹ / ₄
28	13. XI.	Wernsdörfer, Heinrich	38	0,15	2h 37'	vd. Be-	vd. Be-
29						merkung	merkg.
30	14. XI.	Böhm, Adolf	30	9,15	2h 12 ¹ / ₂	2h 27'	14 ¹ / ₂
31	14. XI.	Deimel, Klara	23	0,15	2h 13 ³ / ₄	2h 51'	37 ¹ / ₄
32	14. XI.	Zängerle, Alfred	30	0,15	2h 15'	2h 39 ¹ / ₂	24 ¹ / ₂
33	23. XI.	Deimel, Klara	23	0,15	3h 30 ¹ / ₂	3h 45'	14 ¹ / ₂
34	23. XI.	Gumbberger, Babette	28 ¹ / ₂	0,15	3h 31'	3h 51'	20'
35	23. XI.	Barth, Anna	15 ¹ / ₂	0,15	3h 31 ¹ / ₂	3h 46'	14 ¹ / ₂
36	25. XI.	Deimel, Klara	23	0,15	3h 27 ¹ / ₂	3h 44'	16 ¹ / ₂
37	28. XI.	Wernsdörfer, Heinrich	38	0,15	3h 37'	3h 52'	15'
38	1. XII.	Sueppel, Andreas		0,15	3h 47'	4h 14 ¹ / ₂	27 ¹ / ₂
39	3. XII.	Deimel, Klara	23	0,15	3h 21'	3h 35'	14'
40	4. XII.	Zängerle, Alfred	30	0,15	2h 44'	3h 12'	28'
41	14. XII.	Deimel, Klara	23	0,15	2h 41'	2h 58'	17'
42	14. XII.	Deimel, Klara	23	0,15	2h 46'	3h 05'	19'
43	14. XII.	Gumbberger, Babette	28 ¹ / ₂	0,15	2h 53'	3h 29'	36'
44	23. XII.	Barth, Anna	15 ¹ / ₂	0,15	2h 53'	3h 09'	16'
45	23. XII.	Muthherr, Anna } Zwi-	13 ¹ / ₂	0,15	4h 05'	4h 18'	13'
46	26. XII.	Hammer, Soldat	13 ¹ / ₂	0,15	4h 05'	4h 16'	11'
47	26. XII.	Gärtner, Soldat		0,15	2h 26'	2h 41'	15'
48	26. XII.	Düsel, Soldat		0,15	2h 26'	2h 55'	19'
49	9. I.	Zängerle, Alfred	30	0,15	2h 26'	2h 40'	14'
					3h	3h 15'	15'

No. 28. Der Café wurde eine Viertelstunde vorher zu Hause genommen; um 3h. 45' R. noch nicht vorhanden; weiteres Verbleiben verweigert.

No. 49 zur Tasse Café einen Fashingskrapfen und bis zum Eintritt der R. wurde eine Cigarre geraucht.

Versuche mit Jodkalium in capsul. gelat. 0,15 nach Milch.

No.	Datum	Person		Zeit der Aufnahme	Erste Reaktion	also nach	Bemerkungen.
		Name	Alter				
1	3. I.	Muthherr, Mina	Jahr 13 ¹ / ₂	12 h 12'	12 h 26'	14'	No. 1, 2, 3 1 Tasse warmer Milch
2	3. I.	Muthherr, Anna	13 ¹ / ₂	12 h 12'	12 h 25 ¹ / ₂ '	13 ¹ / ₂ '	mit Zucker u. 1 sog. Weckerl.
3	4. I.	Barth, Anna	15 ¹ / ₂	9 h 49'	10 h 05'	16'	No. 4 1 Tasse w. Milch mit Zucker
4	4. I.	Böhm, Adolf	30	9 h 54'	10 h 07'	13'	ohne Brot.
5	7. I.	Barth, Anna	15 ¹ / ₂	10 h 43 ¹ / ₂ '	11 h 05 ¹ / ₂ '	22'	No. 5 1 Tasse w. Milch mit 2 Thee-
6	9. I.	Muthherr, Mina	13 ¹ / ₂	4 h 41'	4 h 52 ¹ / ₂ '	11 ¹ / ₂ '	löffel Arac und 2 Bröddchen.
7	9. I.	Muthherr, Anna	13 ¹ / ₂	4 h 41'	5 h	19'	No. 6 u. 7 gekochte kalte Milch
8	7. I.	Böhm, Adolf	30	10 h 43 ¹ / ₂ '	10 h 57 ¹ / ₂ '	14'	mit 1 Brot.
9	11. I.	Böhm, Adolf	30	7 h 49'	8 h 02'	13'	No. 8 w. Milch m. Arac ohne Brot.
10	11. I.	Gumberger, Babette	28 ¹ / ₂	7 h 49'	8 h 32'	43'	No. 9 w. Milch m. Arac ohne Brot.
11	11. I.	Barth, Anna	15 ¹ / ₂	7 h 49'	8 h 37 ¹ / ₂ '	48 ¹ / ₂ '	No. 10 u. 11 w. Milch mit Arac
12	18. I.	Deimel, Klara	23	3 h 36'	3 h 53'	17'	mit 1 Brot.
13	20. I.	Böhm, Adolf	30	7 h 36'	7 h 50 ¹ / ₂ '	14 ¹ / ₂ '	No. 12 w. Milch mit Zucker ohne
14	20. I.	Dr. Neumaier, Hans	23	7 h 36'	7 h 52 ¹ / ₂ '	16 ¹ / ₂ '	Brot.
15	20. I.	Gumberger, Babette	28 ¹ / ₂	7 h 39'	8 h 20 ¹ / ₂ '	41 ¹ / ₂ '	No. 13 u. 14 w. Milch mit Zucker
16	20. I.	Barth, Anna	15 ¹ / ₂	7 h 39'	7 h 58'	19'	und ¹ / ₆ Brot. No. 15 u. 16 w. Milch mit Zucker und 1 Brot.

Versuche mit Jodkalium in capsul. gelat. 0,15 nach Bier.

No.	Datum	Person		Zeit der Aufnahme	Erste Reaktion	also nach	Bemerkungen
		Name	Alter				
1	24. I.	Dörfler, Soldat		7 h 12'	8 h 14'	1 h 2'	No. 1—5 inkl. Soldaten der 1. Compagnie; jeder Mann 1 Lt. Bier ohne Brot und ohne Cigarre; seit Mittag will keiner der Soldaten, die Nachmittags über in der Kaserne beschäftigt waren, etwas zu sich genommen haben. Die Kapsel wurde nach Genuss des Liter Bieres genommen, bis zum Eintritt d. R. wurde von jedem Mann noch ca. $\frac{1}{2}$ Liter getrunken.
2	24. I.	Britting, Soldat		7 h 12'	7 h 30'	18'	
3	24. I.	Gärtner, Soldat		7 h 9 $\frac{1}{2}$ '	7 h 32'	22 $\frac{1}{2}$ '	
4	24. I.	Bickl, Soldat		7 h 10'	8 h	50'	
5	24. I.	Braum, Soldat		7 h 9'	7 h 39'	28'	

Versuche mit Jodkalium in capsul. gelat. nach dem Essen.

No.	Datum	Person		Dosis	Zeit der Aufnahme	Erste Reaktion	also nach	Bemerkungen
		Name	Alter					
1	10. IX.	Barth, Anna	Jahr 15 ^{1/2}	0,4	3h 32'	3h 34'	12'	Nach dem Mittag-Essen: No. 1 Suppe, Rindfleisch mit gerösteten Kartoffeln; 1^{1/2} h nach dem Essen wurde die Kapsel genommen! No. 2 Kapsel bei der Aufnahme im Munde zerdrückt. No. 3 u. 4 Suppe, Braten mit Kartoffelsalat = No. 3; No. 4 ausser diesem noch kalten Fisch in Sauce. No. 5 bis 8 Schulmädchen hatten ca. 12 h zu Mittag gegessen. No. 9 schüchterner Junge — Kapsel bei der Aufnahme im Munde zerdrückt. No. 10 Gerstensuppe, Rindfleisch mit Wirsing-Gemüse, schwache Esserin. No. 11 dasselbe wie 10, dazu noch grössere Menge Kartoffelbreies; starker Esser; hat zum Mittagessen auch Bier getrunken.
2	19. IX.	Gumberger, Babette	28 ^{1/2}	0,4	2h 04'	2h 06'	2'	
3	24. IX.	Deimel, Klara	23	0,3	2h 50'	3h	10'	
4	24. IX.	Böhm, Adolf	30	0,3	2h 49'	3h 02'	13'	
5	30. IX.	Thunecke, Grethchen	10 ^{1/2}	0,3	1h 34'	1h 45 ^{1/2} '	11 ^{1/2} '	
6	30. IX.	Schlick, Maria	11	0,3	1h 35'	1h 46'	11'	
7	1. X.	Thunecke, Christine	11 ^{1/2}	0,3	2h 03'	2h 14'	11'	
8	1. X.	Schlick, Jetta	12 ^{1/2}	0,3	2h 2 ^{1/2} '	2h 16'	13 ^{1/2} '	
9	2. X.	Berthold, Andreas	6 ^{1/2}	0,3	2h 08'	2h 09'	1'	
10		Müller, Margarethe	19	0,15	2h	2h 19'	19'	
11		Hauser, Josef	22	0,15	2h	2h 25 ^{1/2} '	25 ^{1/2} '	
1	17. X.	Böhm, Adolf	30	0,2	8h 13 ^{1/2} '	8h 22'	8 ^{1/2} '	Nach dem Abend-Essen: No. 1, 2 bei gleichzeitigen Biergenuss.
2	16. I.	Deimel, Klara	23	0,15	9h 06'	9h 24'	18'	

Versuche mit Jodkalium in capsul. gelatinosis. Nüchtern.

No.	Datum	Person		Dosis	Zeit der Aufnahme	Erste Reaktion	also nach	Bemerkungen
		Name	Alter					
1	9. IX.	Böhm, Adolf	30	0,2	9h 15'	9h 35'	20'	
2	17. IX.	Böhm, Adolf	30	0,4	10h 15'	10h 23'	8'	
3	24. IX.	Gumberger, Babette	28 ¹ / ₂	0,3	8h 46'	8h 57 ¹ / ₂ '	11 ¹ / ₂ '	
4	24. IX.	Barth, Anna	15 ¹ / ₂	0,3	8h 46'	8h 54'	8'	
5	3. X.	Thünecke, Christine	11 ¹ / ₂	0,3	7h 28'	7h 39'	11'	
6	3. X.	Schlick, Jetta	11 ¹ / ₂	0,3	7h 29'	7h 45'	16'	
7	3. X.	Böhm, Adolf	30	0,3	8h 19'	8h 33 ¹ / ₂ '	14 ¹ / ₂ '	
8	16. XI.	Böhm, Adolf	30	0,15	7h 30'	7h 49'	19'	
9	5. XII.	Muthherr, Mina (Zwillinge)	13 ¹ / ₂	0,15	7h 18'	7h 25'	7'	
10	5. XII.	Muthherr, Anna (Zwillinge)	13 ¹ / ₂	0,15	7h 18 ¹ / ₂ '	7h 35'	16 ¹ / ₂ '	
11	5. XII.	Gumberger, Babette	28 ¹ / ₂	0,15	7h 19 ¹ / ₄ '	7h 40'	20 ³ / ₄ '	
12	5. I.	Muthherr, Mina (Zwillinge)	13 ¹ / ₂	0,15	7h 23'	7h 39 ¹ / ₂ '	16 ¹ / ₂ '	
13	5. I.	Muthherr, Anna (Zwillinge)	13 ¹ / ₂	0,15	7h 23'	7h 56 ¹ / ₂ '	33 ¹ / ₂ '	
14	6. I.	Böhm, Adolf	30	0,15	10h 46'	10h 51'	5'	
15	16. I.	Dr. Neumaier, Hans	23	0,15	7h 31'	7h 45 ¹ / ₂ '	14 ¹ / ₂ '	
16	16. I.	Böhm, Adolf	30	0,15	7h 31'	7h 46'	15'	
17	18. I.	Böhm, Adolf	30	0,15	7h 33'	7h 44'	11'	
18	18. I.	Dr. Neumaier, Hans	23	0,15	7h 32'	7h 52 ¹ / ₂ '	20 ¹ / ₂ '	
19	18. I.	Gumberger, Babette	28 ¹ / ₂	0,15	7h 32'	7h 45'	13'	
20	18. I.	Barth, Anna	15 ¹ / ₂	0,15	7h 32'	7h 46'	14'	

